

KÕHUÕÖNE PUNKTSIOON ASTSIIDIVEDELIKU EEMALDAMISEKS

Maksatsirroosi, kasvajate, kroonilise südamepuudulikkuse või muu haiguse tagajärjel võib kõhuõõnde koguneda 10–15 liitrit astsiidivedelikku. Vedeliku kogunemine kõhuõõnde võib põhjustada õhupuudust, raskustunnet ja valu kõhu/selja piirkonnas. Astsiidivedelik eemaldatakse kõhuõõnest punktsiooninõela või -kanüüliga ning pärast eemaldamise protseduuri need sümptomid taanduvad. Raviprotseduur kestab 1–1,5 tundi.

Protseduuriks sobiva asendi otsustab protseduuri läbiviiv arst. Nahk desinfitseeritakse ning punktsioonikohale jääv nahk ja nahaalne kude tuimastatakse. Arst viib spetsiaalse punktsiooninõela või -kanüüli kõhuõõnde ning vedelikul lastakse läbi infusioonitoru välja voolata. Protseduuri lõppemisel eemaldatakse punktsiooninõel ja torkekohale asetatakse plaaster.

Enne protseduuri:

- informeerige protseduuri teostavat arsti, kui tarvitate verevedeldajaid või Teil esineb ravimallergiat;
- tühjendage põis.

Pärast protseduuri:

- lamage, kuni enesetunne võimaldab tõusta ja liikuda;
- punktsioonikohast võib erituda astsiidivedelikku kuni 2 nädalat.

Võimalikud tüsistused on:

- vererõhu langus, kui suure koguse vedeliku väljutamine toimub liiga kiiresti;
- protseduuri järgselt tekkinud kõhuvalu, palavik ja üldine halb enesetunne, mis võib olla märk tekkinud infektsioonist kõhuõõnes

Tüsistuste tekkimisel võtke koheselt ühendust protseduuri tellinud arstiga või pöörduge EMO-sse.

Koostanud: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
www.regionaalhaigla.ee

J. Sütiste tee 19
13419 Tallinn

Patsiendiõpetuse on kinnitanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendus kvaliteedi komitee 21. märtsil 2022. a.