

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА С ⁹⁰Y-ЗЕВАЛИНОМ

В комплексном лечении некоторых не-Ходжкинских лимфом, исходя из конкретной истории болезни, часто применяется лечение ⁹⁰Y-зевалином. ⁹⁰Y-зевалин связывается с лимфомными клетками, имеющими на поверхности антиген CD20, что вызывает разрушение этих клеток. Во время лечения пациент дважды кратковременно находится на стационаре, где в его распоряжении имеются одноместная лечебная палата с туалетом, раковиной и душевым уголком, кроме того в палате есть телевизор, кабельный и беспроводной интернет, телефон, холодильник, микроволновая печь и фен.

Показание к проведению лечения: не-Ходжкинская лимфома, в зависимости от конкретной формы заболевания и фазы лечения.

Противопоказания к проведению лечения:

- беременность;
- кормление грудью;
- гиперчувствительность в отношении компонентов лекарства.

Проинформируйте своего лечащего врача и персонал исследования, если:

- Вы беременны;
- кормите ребенка грудью;
- у Вас имеется клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства).

Возможные побочные действия

- кровоизлияния, снижение уровня тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов;
- тошнота, боль в животе, понос, нарушения пищеварения;
- слабость, лихорадка, озноб;
- реакции гиперчувствительности;
- костная или мышечная боль.

Подготовка к лечению

В ходе консультации перед началом лечения Вам разъяснят связанные с процедурой детали, ход лечения, ожидаемую пользу и возможные побочные действия. Также Вы получите индивидуальные инструкции на периоды до и после лечения.

Кормление грудью следует прекратить непосредственно перед началом лечения.

Поскольку во время лечения беременность противопоказана, то при необходимости перед проведением лечебной процедуры делают тест на беременность. После лечения в течение по меньшей мере шести месяцев избегайте зачатия детей.

Проведение лечения

В день проведения лечения Вам еще раз разъяснят связанные с процедурой детали, ход лечения, связанные с лечением требования по радиационной безопасности, а также соберут анамнез и возьмут анализы крови. Перед процедурой Вам нужно будет подписать бланк согласия.

Лечение проводится в два этапа с недельным интервалом.

В первый раз (во время 1-го дня лечения) проводится инфузия нерадиоактивного лекарства ритуксимаба.

Во второй раз (на 7-й, 8-й или 9-й день лечения) сначала проводят инфузию нерадиоактивного лекарства ритуксимаба, и по прошествии четырех часов в течение 10 минут вводят ⁹⁰Y-Зевалин.

После лечебной процедуры:

- пейте больше жидкости, чтобы быстрее вывести из организма оставшийся не связанным лекарственный препарат;
- в течение одного месяца ограничьте близкие контакты с окружающими, особенно с младенцами, маленькими детьми и беременными, а также с кормящими грудью женщинами;
- прекратите кормление грудью;
- в течение по меньшей мере шести месяцев используйте эффективные средства контрацепции, чтобы избежать зачатия ребенка;
- после лечения Вы останетесь под наблюдением врача;
- при необходимости Вам будут даны дополнительные индивидуальные рекомендации по радиационной безопасности, которые следует соблюдать.

Для получения дополнительных разъяснений просим звонить по номерам: 617 1221 или 617 1216 или 617 1085.

ЦУ Северо-Эстонская региональная больница

ул. Сютисте, 19
13419 Таллинн

www.regionaalhaigla.ee
info@regionaalhaigla.ee

Информационный листок составлен отделением ядерной медицины ЦУ Северо-Эстонской региональной больницы (2018)