

УХОД ЗА ТУННЕЛИРУЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ВЕНОЗНЫМ КАТЕТЕРОМ ИЛИ КАТЕТЕРОМ ГРОШОНГА

Туннелируемый центральный венозный катетер, или катетер Грошонга – это изделие медицинского назначения, которое устанавливается в центральную вену (рис. 1) для длительного введения лекарственных препаратов, инфузионной терапии, повторных переливаний крови, парентерального питания и забора анализов крови. Введение лекарственных препаратов и забор анализов крови используется через катетер без использования иглы. Наружная часть катетера Грошонга крепится в области под ключицей (рис. 1 и 2). Катетер Грошонга устанавливается пациенту с рекомендацией изготовителя на срок до 2,5 лет или по распоряжению лечащего врача. Решение о необходимости установки катетера и его удалении принимает лечащий врач. Перед проведением процедуры по установке катетера у вас будет запрошено письменное согласие.




Рисунок 1. Катетер Грошонга.



Рисунок 2. Крепление катетера Грошонга.

Подготовка к процедуре

- Не раньше, чем за 2 дня до процедуры необходимо сдать анализы крови и встретиться с сестрой-консультантом, которая расскажет Вам/Вашим близким о предстоящей процедуре и связанных с ней действиях.
- Сообщите врачу или сестре обо всех принимаемых лекарствах, прежде всего – о разжижающих кровь лекарствах.
- Процедура проводится под местной анестезией. **Не ешьте минимум за 6 часов и не пейте минимум за 4 часа до процедуры.**
- За три часа до процедуры не курите, поскольку курение сужает кровеносные сосуды.
- Приходите в больницу в день процедуры утром в 8:00 часов.
- Процедура проводится в отделении дневной хирургии, в операционной. Процедура длится от 30 минут до 1 часа. Процедуру проводит врач-анестезиолог, прошедший соответствующее обучение.
- Рекомендуем Вам оставить ценные вещи дома, поскольку перед процедурой необходимо снять и сдать на хранение все украшения, заклёпки, очки, контактные линзы и съемные зубные протезы.

Период после процедуры

- Пользоваться катетером можно сразу после его установки в зависимости от лечения.
- После процедуры место установки катетера может быть болезненным. Заранее приобретите в аптеке обезболивающие, продающиеся без рецепта: парацетамол или ибупрофен.
- Непосредственно после процедуры в области установки может возникнуть небольшая припухлость или кровоподтек, обычно они проходят за пару дней.
- Для крепления катетер подшивается к коже специальной нитью. Верхние швы снимаются через 7 дней, нижние – через 14 дней после процедуры. Для снятия швов обратитесь семейному врачу/сестре или к сестре домашнего ухода.

Уход за катетером Грошонга

- Во время пребывания в больнице сестра будет вести наблюдение и осуществлять уход за областью введения катетера, а также будет менять влажные, загрязнившиеся или отклеившиеся пластыри. Сообщите сестре, если Вы испытываете дискомфорт, отечность или беспокоящую боль в области установки.
- Если после установки катетера необходимо остаться в больнице, то сестра будет следить за состоянием раны и выполнять уход за раной. Если после установки катетера Вы отправляетесь домой, то Вам необходимо самостоятельно следить за областью установки катетера.
- Уход (в т.ч. снятие швов) выполняет семейная сестра, сестра по домашнему уходу или сестра в больнице на самостоятельном приеме.
- Внимательно следите за областью установки катетера. По необходимости меняйте пластырь, если он испачкался, намок или отклеился от кожи.
- Область установки катетера можно мыть спустя 24 часа после процедуры установки. На время мытья закройте линию/линии катетера и соединительный коннектор водостойким пластырем. Во время принятия ванны следите, чтобы линии катетера и место вывода катетера не попали в воду.
- После снятия швов можно не закрывать пластырем рану и выходное отверстие катетера, если лечащий врач или семейный врач не распорядились иным образом.
- При наличии катетера запрещено посещать бассейн и сауну.

Свяжитесь с сестрой-консультантом, лечащим врачом или семейным врачом/сестрой в следующих случаях:

- вокруг катетера появится припухлость, покраснение или боль;
- у Вас появится одышка, головокружение или поднимется температура.

Если у Вас нет возможности связаться с врачом или сестрой, то обратитесь за помощью в ближайшее отделение неотложной медицины.

Регулярное промывание катетера Грошонга

- Катетер Грошонга необходимо регулярно промывать между курсами лечения или по окончании лечебного курса. Катетер необходимо промывать каждые 7 дней, если он не используется.
- Промывка позволит избежать закупорки катетера и обеспечит его исправность.
- Промывка катетера выполняется в больнице или сестрой, прошедшей соответствующее обучение. Уточните у сестры-консультанта необходимость и возможности промывки.

Индивидуальная информация для пациента

Телефон сестры-консультанта:

Швы установленного Вам катетера необходимо снять в следующие даты:

верхние швы: 20 г. нижние швы 20 г.

График ухода за раной и промывки установленного Вам катетера:

дата и год	уход за раной	промывка катетера	дата и год	уход за раной	промывка катетера